

剖腹產常見自費項目介紹

ERAS團隊製作

ERAS個案管理師-林淑慧專師
陳怡伶專師
邱湘玉專師

LOVE CARE HOPE CURE



台東馬偕紀念醫院
Taitung MacKay Memorial Hospital

自費品項

需請跟您的團隊醫護人員進行討論，選擇最適合您的選項

- 飲沛
- 彈性襪
- 促進子宮收縮
- 防沾黏
- 術後疼痛控制
- 促進腹腔傷口癒合
- 傷口敷料
- 防疤貼片/防疤
- 淡化色素軟膏類



LOVE CARE HOPE CURE



準備手術前

飲沛

1. 飲沛於怡樂適療程也能縮短術前禁食時間，至麻醉前2小時還可以喝水、運動飲料或醣類飲料等清流質食物。
2. 研究認為這是安全無虞的，可讓病人感到放鬆且愉悅，也能避免長時間禁食產生脫水、低血糖等不適，及減少術後胰島素阻抗現象。



LOVE CARE HOPE CURE

彈性襪


- 1.目的為促進下肢血液回流，機械性防血栓。
- 2.深層靜脈血栓形成(DVT)是血液在深靜脈內不正常凝結引起的靜脈回流障礙性疾病，主要由靜脈壁損傷、血流緩慢和血液高凝結狀態等所致，多發生於下肢。
- 3.於送手術前穿上，並於手術完畢於移床前脫下。



促進子宮收縮- Carbetocin

防止子宮乏力和大量出血

- 是長效的oxytocin作用劑。
 - carbetocin會選擇性地結合到子宮平滑肌上的oxytocin受體，刺激子宮規律地收縮、提高子宮肌肉的張力等。
 - 對於產後的子宮，能增加子宮自然收縮的速率和力量。施打carbetocin後會迅速開始子宮收縮，能在2分鐘內取得強力收縮。
 - 嬰兒出生後，與需要輸注幾小時的oxytocin相比，靜脈注射單一劑100微克carbetocin就足以維持度的子宮收縮，可以防止子宮乏力和大量出血。





手術時使用的 自費產品

防沾黏、促進傷口癒合

防沾黏

- Adept-克沾黏溶液(4%Icodextrin)
- Hanbio Barrigel瀚醫生技防粘連可吸收膠
- Protahere-玻達癒可吸收防沾黏凝膠



“百特” 克沾黏溶液Adept(4%Icodextrin)



- 手術後預防沾黏使用，能有效降低術後沾黏發生率及嚴重度。
- **4% icodextrin是種葡萄糖聚合物**，可以降低粘黏的範圍及嚴重度。
在手術後可放置於腹腔內，此種高分子的存在形成腹膜表面一個連續液體層，而7~10天後在腹腔裡提供水劃漂浮作用(hydroflotation)暫時隔離腹膜表面，減少沾黏形成，之後由淋巴系統慢慢吸收，能有效達到腹骨盆腔**全方位**防沾黏的效果。



LOVE CARE HOPE CURE

瀚醫生技防粘連可吸收膠 HANBIO BarriGel

- 防粘連可吸收膠是唯一天然透明且黏稠的大分子**玻尿酸凝膠**，不同於另一個小分子產品需要靠人體溫度讓它產生自鏈結，所以不受溫度影響較好推擠及塗抹。
- 比起片狀的防沾黏產品更能節省手術時間，兩週後可以分解吸收。



LOVE CARE HOPE CURE

玻達癒可吸收防沾黏凝膠

PROTAHERE Absorbable Adhesion Barrier


- 本品本產品為為專利 CHAP 酯交聯技術製造，為4%透明質酸玻尿酸凝膠，為具有黏稠性及延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織間的沾黏。用於手術患處黏附性高、不易位移，有效避免沾黏組織產生，在體內維持7-14天的作用。



LOVE CARE HOPE CURE

促進腹腔傷口癒合

- 速原水性傷口敷料
NewEpi Liquid Wound Dressing
- 癒立安膠原蛋白敷料
HealiAid Collagen Wound Dressing



速原水性傷口敷料

NewEpi Liquid Wound Dressing

運用多醣體微包覆寡胜肽含小分子玻尿酸，形成雙效修復微粒子，維持臨床作用活性，短時間內促進傷口癒合，促進深淺層潰瘍傷口及受損組織的修復及再生。



LOVE CARE HOPE CURE

癒立安膠原蛋白敷料

HealiAid Collagen Wound Dressing

- 成份為天然且高純度**膠原蛋白**所製得，可促進血小板聚集，填補傷口處後，可防止血凝塊收縮引起的續發性裂。
- 癒立安膠原蛋白敷料具有良好的生物相容性，有助於促進傷口癒合，靈活地應用於各式傷口處理過程。



術後傷口照顧-赫麗敷高滲液手術敷料 HeraDerm Absorbent Wound Dressing

- 有效吸收傷口滲出血液及組織液，A+高分子水膠使傷口床維持在濕潤均衡狀態；具有親膚矽膠膜(矽感壓膠)，可避免移除敷料時造成周圍皮膚的損傷。材質柔軟具延展性，具防水，可微撕開再貼回，維持皮膚伏貼度。
- 術後縫合完使用一片，出院當天使用一片，每4~7天換一片至術後三週，共約2~4片。



LOVE CARE HOPE CURE



防疤 自費產品介紹

防疤貼片/防疤、淡化色素軟膏類

• 防疤貼片

1. 赫麗敷疤痕貼片為親膚性佳、低過敏、不易刺激皮膚的醫療級感壓膠敷料。針對縱向疤痕的單向伸展設計，同時橫向非彈性設計能有效固定疤痕壓制疤痕增生，並幫助新生組織恢復平整，預防疤痕產生。
2. 術後三週開始使用,4~7天更換壹片
若預計使用至術後6個月,約需23~40片



LOVE CARE HOPE CURE

防疤貼片/防疤、淡化色素軟膏類

◆方案1-防疤/淡化色素軟膏類

- 1.NEOVIDERM 加納軟膏(主成分：專利成分-Beta葡聚醣、海藻酸鈉、玻尿酸可淡化色素、預防疤痕、嬰兒屁屁膏)
- 2.從術後換藥即可搭配敷料、防疤貼片使用~6M



LOVE CARE HOPE CURE

防疤貼片/防疤、淡化色素軟膏類

• 方案2-安適康疤痕護理矽膠筆

AnsCare LeniScar Silicone Stick，主成分為高分子矽化物、矽彈性體、酯化維生素C、維生素E及甲酚曲唑三矽氧烷,提供UVB和UVA範圍防護(SPF20,PA+++),抵抗紫外線照射、減少疤痕色素沉澱；具有先進保水技術，維持長效保濕；酯化維他命C&E成分，提供全面的疤痕照護。

方案A:

從術後第三週換藥即可使用,等3~5分鐘搭配防疤貼片使用~6M

方案B:

從術後第三週換藥即可使用,等3~5分鐘搭配防疤貼片使用~2M,之後單擦軟膏,早晚使用~6M



約可使用4~6個月



LOVE CARE HOPE CURE



術後止痛

術後疼痛控制

- 目前術後止痛藥大概分成這三類:NSAID, Opioid,PCA。
- 各藥品的副作用部分，也都會造成醫師的憂慮，所以需要專業評估後使用。

若您想先了解，可以點選官方Line的“剖腹產麻醉”

