

經皮內視鏡胃造口術(PEG)護理指導

經皮穿刺胃造口術是由腸胃專科醫師以胃鏡方式放置胃造廈管。

PEG 優點(相較鼻胃管):

1. 美觀，可用衣服蓋住、外表看不出
2. 不易脫落、不易自拔
3. 不需時常更換(每 6 個月更換)
4. 不會造成鼻孔、食道壓傷、潰瘍、出血

哪些人適合做 PEG？


1. 吞嚥困難、需管灌時間長達三個月以上
2. 頭頸部腫瘤及臉部外傷無法放置鼻胃管者

哪些人不適合做 PEG？

1. 胃部惡性腫瘤、食道完全阻塞
2. 腹水、腹膜炎、腹膜透析、凝血功能異常
3. 腹部皮膚狀況不好

胃造廈口照護：每天觀察傷口狀況

1. 傷口癒合前換藥流程：生理食鹽水棉枝擦拭
→優點棉枝擦拭→生理食鹽水棉枝擦拭→
切口紗布覆蓋
2. 傷口癒合後換藥流程：生理食鹽水棉枝擦拭→切口紗布覆蓋



參考資料:1. Rahnemai-Azar, A. A., Rahnemaiazar, A. A., Naghshizadian, R., Kurtz, A., & Farkas, D. T. (2014). Percutaneous endoscopic gastrostomy: indications, technique, complications and management. World journal of gastroenterology, 20(24), 7739-51. 2. 江文忍、林宴如、張嘉慧、陳筱瑀(民101)。經皮內視鏡胃造口之介紹及其護理。護理雜誌, 59(4), 94-97。